


## Anzeichen einer Kolik



### Sofort-Maßnahmen bei einer Kolik:

- ✓ Ruhe bewahren (Unterstützung holen)
- ✓ Tierarzt informieren!
- ✓ Kein Futter und Wasser geben
- ✓ Kreislaufstabile Pferde führen (siehe PAT-Werte)
- ✓ Wälzen ist erlaubt → anschließend zum Aufstehen animieren
- ✓ Hänger bereitstellen
- ✓ An den Eigenschutz denken!



### Ist der Kreislauf stabil?

PAT-Werte kontrollieren:

PULS*	ATMUNG*	TEMPERATUR
<b>28 - 40</b> Schläge pro Minute	<b>8 - 16</b> Atemzüge pro Minute	<b>37,5 - 38,2</b> Grad Celsius

\* Normalwert in Ruhe

Name + Telefonnummer Tierarzt:



## ColoSan® – WIRKT KOLOSSAL

Bei futterbedingten Blähungen und Magen-Darm-Störungen.

### DOSIERUNG:

3 ml je 100 kg Körpergewicht unverdünnt seitlich in die Backentasche geben. Bei Bedarf nach 30 Min. wiederholen.

### WIRKSTOFFE:

Sternanisöl, Bitterfenchelöl, Kümmelöl, Chinesisches Zimtöl, Schwefel.

